


## التمثيل المبياني لدالة


### 1- تقعر منحنى دالة -- نقطة انعطاف

#### 1-1 تعريف

لتكن  $f$  قابلة للاشتقاق على مجال  $I$   
 نقول إن المنحنى  $(C_f)$  محدب إذا كان يوجد فوق جميع مماساته  
 نقول إن المنحنى  $(C_f)$  مقعر إذا كان يوجد تحت جميع مماساته




مقعر



محدب

#### 2-1 تعريف

لتكن  $f$  دالة عددية قابلة للاشتقاق على  
 مجال مفتوح  $I$  و  $x_0 \in I$ .  
 نقول إن النقطة  $A(x_0; f(x_0))$  نقطة انعطاف  
 للمنحنى  $(C_f)$  إذا تغير تقعر المنحنى  $(C_f)$   
 عند  $A$



#### 3-1 خصائص

- \*  $f$  دالة قابلة للاشتقاق مرتين على مجال  $I$
- \* إذا كانت " $f$  موجبة على  $I$  فان  $(C_f)$  يكون محدبا على  $I$
- \* إذا كانت " $f$  سالبة على  $I$  فان  $(C_f)$  يكون مقعرا على  $I$
- \* إذا كانت " $f$  تنعدم في  $x_0$  من المجال  $I$  وكان يوجد  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$  بحيث إشارة " $f$  على  $[x_0, x_0 + \alpha[$  مخالفة لإشارة " $f$  على  $]x_0 - \alpha, x_0]$  فان  $M_0(x_0; f(x_0))$  نقطة انعطاف للمنحنى  $(C_f)$

**ملاحظة** قد لا تكون الدالة  $f$  قابلة للاشتقاق مرتين ويكون مع ذلك لمبيانها نقطة انعطاف

تمرين  $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 1$  و  $g(x) = \frac{1-2x}{x^2-x-2}$

1- أدرس تقعر  $C_f$  واستنتج أن النقطة  $A$  ذات الأفصول 1 نقطة انعطاف للمنحنى  $C_f$

2 - أدرس تقعر  $C_g$  و حدد نقط انعطاف المنحنى  $C_g$



#### 2- الفروع اللانهائية

##### 1-2 تعريف

إذا آلت إحدى إحداثيتي نقطة من  $C$  منحنى دالة إلى اللانهاية فإننا نقول إن  $C$  يقبل فرعاً لانهاية.

2-2 مستقيم مقارب لمنحنى  
أ- المقارب الموازي لمحور الأرتاب  
تعريف

إذا كان  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$  أو  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$  فإن المستقيم الذي معادلته  $x = a$  مقارب لـ  $C_f$





مثال  $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$

لدينا  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$  ومنه المستقيم ذا المعادلة  $x = 1$  مقارب عمودي للمنحنى

ب- المقارب الموازي لمحور الأفصيل  
تعريف


إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$  فإن المستقيم ذا المعادلة  $y = b$  مقارب لـ  $C_f$ .



مثال  $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$

لدينا  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$

ومنه المستقيم ذا المعادلة  $y = 2$  مقارب أفقي للمنحنى



### ج- المقارب المائل

تعريف

يكون المستقيم الذي معادلته  $y = ax + b$  مقارب للمنحنى  $C_f$  إذا وفقط إذا كان  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$  أو  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$

خاصية

يكون المستقيم الذي معادلته  $y = ax + b$  مقارب للمنحنى  $C_f$  إذا وفقط إذا كانت توجد دالة  $h$  حيث يكون  $f(x) = ax + b + h(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$  أو  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$

مثال

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 1}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{1\} \quad f(x) = x - 2 - \frac{1}{x - 1}$$

ومنه المستقيم ذا المعادلة  $y = x - 2$  مقارب مائل للمنحنى (بجوار  $+\infty$ )  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x - 1} = 0$

ومنه المستقيم ذا المعادلة  $y = x - 2$  مقارب مائل للمنحنى (بجوار  $-\infty$ )  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x - 1} = 0$

في كثير من الأحيان يصعب كتابة على شكل  $f(x) = ax + b + h(x)$  حيث  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = 0$

تقنية تحديد مقارب مائل



لنفترض أن  $f(x) = ax + b + h(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (b + h(x)) = b \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( a + \frac{b}{x} + \frac{1}{x} h(x) \right) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0 \quad \text{فان} \quad \left( \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a \right)$$

يكون المستقيم ذو المعادلة  $y = ax + b$  مقارب لمنحنى  $C_f$  إذا وفقط إذا كان

$$\left( \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - ax) = b \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a \right) \quad \text{أو} \quad \left( \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a \right)$$



ملاحظة دراسة إشارة  $(f(x) - (ax + b))$  تمكننا من معرفة وضع المنحنى ( $C_f$ ) بالنسبة للمقارب المائل.

مثال

$$f(x) = \sqrt{4x^2 + x} - 2$$

حدد المقارب المائل بجوار  $+\infty$  ثم بجوار  $-\infty$

أ - إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$  نقول إن  $(C_f)$  يقبل فرعاً شلجيمياً في اتجاه محور الأرتاب.

ب - إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$  نقول إن  $(C_f)$  يقبل فرعاً شلجيمياً في اتجاه محور الافاصيل

ج - إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - ax = \pm\infty$  نقول إن  $(C_f)$  يقبل فرعاً شلجيمياً في اتجاه المستقيم ذا المعادلة  $y = ax$

بصفة عامة

إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$  نقول إن  $(C_f)$  يقبل المستقيم ذا المعادلة  $y = ax$  كاتجاه مقارب.

3- مركز تماثل - محور تماثل

3-1 محور تماثل

إذا كان  $(C_f)$  يقبل المستقيم الذي معادلته  $x = a$  كمحور تماثل

فهذا يعني أن معادلة  $(C_f)$  في المعلم  $(\Omega; \vec{i}; \vec{j})$  حيث  $\Omega(a; 0)$

هي على شكل  $Y = f(a + X) = \varphi(X)$  حيث  $\varphi$  دالة زوجية و  $\begin{cases} X = x - a \\ Y = y \end{cases}$

أي أن  $\forall X \in D_\varphi \quad \varphi(-X) = \varphi(X)$

أي  $\forall X \in D_\varphi \quad f(a - X) = f(a + X)$

بما أن  $X = x - a$  فان  $f(2a - x) = f(x) \quad \forall x \in D_f$

خاصية

في معلم متعامد , يكون المستقيم الذي معادلته  $x = a$  محور تماثل لمنحنى دالة  $f$  إذا وفقط إذا كان

$$\forall x \in D_f \quad (2a - x) \in D_f ; \quad f(2a - x) = f(x)$$

3-2 مركز تماثل

إذا كان  $(C_f)$  يقبل النقطة  $\Omega(a; b)$  كمركز تماثل

فهذا يعني أن معادلة  $(C_f)$  في المعلم  $(\Omega; \vec{i}; \vec{j})$

هي على شكل  $Y + b = f(a + X)$

أي  $Y = f(a + X) - b = \varphi(X)$

حيث  $\varphi$  دالة فردية و  $\begin{cases} X = x - a \\ Y = y - b \end{cases}$

أي أن  $\forall X \in D_\varphi \quad \varphi(-X) = -\varphi(X)$

أي  $\forall X \in D_\varphi \quad f(a - X) - b = -f(a + X) + b$

أي  $\forall X \in D_\varphi \quad f(a - X) = 2b - f(a + X)$

بما أن  $X = x - a$  فان  $f(2a - x) = 2b - f(x) \quad \forall x \in D_f$

خاصية

في معلم ما, تكون النقطة  $\Omega(a; b)$  مركز تماثل لدالة  $f$  إذا وفقط إذا كان

$$\forall x \in D_f \quad (2a - x) \in D_f ; \quad f(2a - x) = 2b - f(x)$$

تمرين

$$(1) \quad f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3} \quad \text{بين أن المستقيم } x=1 \text{ محور تماثل للمنحنى } (C_f)$$

$$(2) \quad f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 1} \quad \text{بين أن النقطة } \Omega(1;2) \text{ مركز تماثل للمنحنى } (C_f)$$

#### 4- الدالة الدورية

##### 1-4 تعريف

نقول أن دالة دورية إذا وجد عدد حقيقي  $T$  موجب قطعاً بحيث  
 $\forall x \in D_f \quad x + T \in D_f ; \quad x - T \in D_f \quad f(x + T) = f(x)$   
 العدد  $T$  يسمى دور الدالة  $f$ . اصغر دور موجب قطعاً يسمى دور الدالة

##### أمثلة

\* الدالتان  $x \rightarrow \sin x$  و  $x \rightarrow \cos x$  دوريتان و دورهما  $2\pi$   
 \* الدالة  $x \rightarrow \tan x$  دورية دورها  $\pi$

\* الدالتان  $x \rightarrow \sin ax$  و  $x \rightarrow \cos ax$  (حيث  $a \neq 0$ ) دوريتان و دورهما  $\frac{2\pi}{|a|}$

\* الدالة  $x \rightarrow \tan ax$  (حيث  $a \neq 0$ ) دورية دورها  $\frac{\pi}{|a|}$

##### تمرين


حدد دورا للدوال  $x \rightarrow \cos x - \sin x$  و  $x \rightarrow 3 - \cos \frac{1}{4}x$  و  $x \rightarrow \tan 3x$  و  $x \rightarrow \cos^2 x$

#### 4-2 خاصية

إذا كانت للدالة  $f$  دور  $T$  فإن  $\forall x \in D_f, \forall n \in \mathbb{Z} \quad f(x + nT) = f(x)$

(نبين الخاصية بالاستدلال بالترجع)  
 3-4 التمثيل المبياني لدالة دورية

لتكن  $f$  دورية دورها  $T$  و  $(C_f)$  منحنها في مستوى منسوب ال معلم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$



منحنى الدالة  $f$  على  $D_f \cap [x_0 + nT; x_0 + (n+1)T]$  هو صورة منحنى الدالة على  $D_f \cap [x_0; x_0 + T]$  بواسطة الإزاحة ذات المتجهة  $nT \cdot \vec{i}$  حيث  $n$  عدد صحيح نسبي.

##### ملاحظة:

لإنشاء منحنى دالة دورية يكفي إنشائه جزئه على مجال من نوع  $I_0 = D_f \cap [x_0; x_0 + T]$   
 استنتاج المنحنى باستعمال الإزاحة  $t_{n\vec{i}}$

##### أمثلة

\* دالة  $x \rightarrow \cos x$  دورية ودورها  $2\pi$  إذن يكفي دراستها على  $]-\pi; \pi]$

و حيث أن  $x \rightarrow \cos x$  زوجية فنقتصر دراستها على  $[0; \pi]$

$$\forall x \in [0; \pi] \quad (\cos x)' = -\sin x$$


جدول التغيرات

$x$	0	$\pi$
$\cos x$	1	-1

دالة  $x \rightarrow \sin x$  دورية ودورها  $2\pi$  إذن يكفي دراستها على  $]-\pi; \pi]$   
 و حيث أن  $x \rightarrow \sin x$  فردية فنقتصر دراستها على  $[0; \pi]$   
 $\forall x \in [0; \pi] \quad (\sin x)' = \cos x$

جدول التغيرات

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$
$\sin x$	0	1	0




\*\* دالة  $x \rightarrow \tan x$  حيز تعريفها  $\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$  و دورية ودورها  $\pi$  إذن يكفي دراستها على  $\left] \frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$

و حيث أن  $x \rightarrow \tan x$  فردية زوجية فنقتصر دراستها على  $\left[ 0; \frac{\pi}{2} \right[$

$$\forall x \in \left[ 0; \frac{\pi}{2} \right[ \quad (\tan x)' = 1 + \tan^2 x$$

جدول التغيرات

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan x$	0	$+\infty$



- تحديد مجموعة التعريف ثم تحديد مجموعة الدراسة (خاصة إذا كانت  $f$  زوجية أو فردية أو دورية)
- دراسة الاتصال و الاشتقاق و تحديد الدالة الاشتقاق و دراسة إشارتها
- وضع جدول التغيرات
- دراسة الفروع النهائية
- دراسة التقعر إن كان ذلك ضروريا و تحديد نقط انعطاف إن وجدت
- إنشاء المنحنى

تمرين

أدرس ومثل مبيانيا الدالة  $f$  في الحالات التالية

$$c) : f(x) = \cos x + \frac{1}{2} \cos 2x \quad b) : f(x) = \frac{2|x|}{x^2 + 1} \quad a) : f(x) = x - 3 + \frac{1}{x - 2}$$

## تمارين و حلولها

## تمرين 1

نعتبر  $f$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي المعرفة بـ:  $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 2}$

ليكن  $(C_f)$  منحنى الدالة  $f$  في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

-1 أ) حدد  $D_f$

ب) حدد  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ج) حدد  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  و أول النتيجةين هندسيا

-2 أ) بين أن  $\forall x \in D_f \quad f'(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$

ب) أدرس تغيرات  $f$  و أعط جدول تغيراتها

-3 حدد معادلة المماس للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الأفصول 0

-4 بين أن النقطة  $A(2;1)$  مركز تماثل للمنحنى  $(C_f)$

-5 بين أن المستقيم ذا المعادلة  $y = x - 1$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$  و  $-\infty$

-6 أنشئ  $(C_f)$

الجواب

$$f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 2}$$

أ) نحدد  $D_f$

$$D_f = \mathbb{R} - \{2\}$$

ب) نحدد  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 1 + \frac{1}{x - 2} = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 + \frac{1}{x - 2} = +\infty$$

ج) حدد  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  و أول النتيجةين هندسيا

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x - 1 + \frac{1}{x - 2} = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x - 1 + \frac{1}{x - 2} = +\infty$$

ومنه المستقيم ذا المعادلة  $x = 2$  مقارب عمودي للمنحنى  $(C_f)$

$$\forall x \in D_f \quad f'(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2} \quad \text{أ-2 نبين أن}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{2\} \quad f(x) = x - 1 + \frac{1}{x-2}$$

$f$  دالة قابلة للاشتقاق في كل نقطة من  $\mathbb{R} - \{2\}$  (لأن  $f$  دالة جذرية)

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{2\} \quad f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-2)^2} = \frac{(x-2)^2 - 1}{(x-2)^2} = \frac{(x-3)(x-1)}{(x-2)^2}$$

ب) ندرس تغيرات  $f$  و نعطي جدول تغيراتها

إشارة  $f'(x)$  هي إشارة  $(x-3)(x-1)$

$x$	$-\infty$	$1$	$2$	$3$	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	$0$	$-$	$-$	$0$	$+$
$f$	$-\infty$	$-1$	$-\infty$	$+\infty$	$3$	$+\infty$

3- نحدد معادلة المماس للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الأفصول 0

معادلة المماس للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الأفصول 0 هي  $y = f'(0)x + f(0)$

$$\text{أي هي } y = -\frac{3}{4}x - \frac{3}{2}$$

4- نبين أن النقطة  $A(2;1)$  مركز تماثل للمنحنى  $(C_f)$

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{2\} \quad 4 - x \in \mathbb{R} - \{2\}$$

$$2 - f(x) = 2 - x + 1 - \frac{1}{x-2} = 3 - x + \frac{1}{2-x} \quad ; \quad f(4-x) = 3 - x + \frac{1}{2-x}$$

ومنه  $f(4-x) = 2 - f(x)$  إذن  $A(2;1)$  مركز تماثل للمنحنى  $(C_f)$


5- نبين أن المستقيم ذا المعادلة  $y = x - 1$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$  و  $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (x-1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x-2} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x-1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-2} = 0$$

إذن المستقيم ذا المعادلة  $y = x - 1$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$  و  $-\infty$

6- ننشئ  $(C_f)$





## تمرين 2

$$f(x) = 1 + \frac{1-2x}{x^2-x-2}$$

نعتبر الدالة العدية  $f$  للمتغير الحقيقي المعرفة بـ

1- حدد  $D_f$  و حدد نهايات  $f$  عند محداث  $D_f$

2- حدد  $f'(x)$  لكل  $x$  من  $D_f$

3- أدرس تغيرات  $f$

4- أ- بين أن  $C_f$  يقبل  $I\left(\frac{1}{2}; 1\right)$  كنقطة انعطاف.

ب- بين أن  $I\left(\frac{1}{2}; 1\right)$  مركز تماثل لـ  $C_f$

د- حدد معادلة المماس لـ  $C_f$  عند النقطة  $I$

5- أ- أدرس الفروع اللانهائية

ب- أنشئ المنحنى  $C_f$

## الحواب

$$f(x) = 1 + \frac{1-2x}{x^2-x-2}$$

2- نحدد  $D_f$  ونحدد نهايات  $f$  عند محداث  $D_f$

ليكن  $x \in \mathbb{R}$

$$x \in D_f \Leftrightarrow x^2 - x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1 \quad \text{et} \quad x \neq 2$$

$$D_f = ]-\infty; -1[ \cup ]-1; 2[ \cup ]2; +\infty[ \quad \text{إذن}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1-2x}{x^2-x-2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2}{x} = 0 \quad \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 1 + \frac{1-2x}{x^2-x-2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} 1-2x = -3 \quad \lim_{x \rightarrow 2} x^2-x-2 = 0 \quad \text{لدينا}$$

$x$	$-\infty$	$-1$	$2$	$+\infty$
$f(x)$	$+$	$0$	$0$	$+$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 1 + \frac{1-2x}{x^2-x-2} = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 + \frac{1-2x}{x^2-x-2} = -\infty \quad \text{ومنه}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} 1-2x = 3 \quad \lim_{x \rightarrow -1} x^2-x-2 = 0 \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} 1 + \frac{1-2x}{x^2-x-2} = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} 1 + \frac{1-2x}{x^2-x-2} = -\infty \quad \text{ومنه}$$

2- نحدد  $f'(x)$  لكل  $x$  من  $D_f$

$$f'(x) = \frac{(1-2x)'(x^2-x-2) - (x^2-x-2)'(1-2x)}{(x^2-x-2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2(x^2-x-2) - (2x-1)(1-2x)}{(x^2-x-2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 2x + 4 + 4x^2 - 4x + 1}{(x^2-x-2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 2x + 5}{(x^2-x-2)^2}$$

3- ندرس تغيرات  $f$

$$\forall x \in D_f \quad f'(x) = \frac{2x^2 - 2x + 5}{(x^2-x-2)^2}$$

إشارة  $f'(x)$  هي إشارة  $2x^2 - 2x + 5$

$$\Delta = 4 - 40 = -36$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad 2x^2 - 2x + 5 > 0 \quad \text{اذن}$$

جدول التغيرات  $f$

$x$	$-\infty$	$-1$	$2$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	$+$	$+$
$f$	$1$	$+\infty$	$+\infty$	$1$

4- أ- نبين أن  $C_f$  يقبل  $I\left(\frac{1}{2}; 1\right)$  كنقطة انعطاف.

$$\forall x \in D_f \quad f''(x) = \frac{-2(2x-1)(x^2-x+7)}{(x^2-x-2)^3}$$

$f''(x)$  تنعدم في  $\frac{1}{2}$  مع تغيير الإشارة إذن  $C_f$  يقبل  $I\left(\frac{1}{2}; 1\right)$  كنقطة انعطاف

ب- نبين أن  $I\left(\frac{1}{2}; 1\right)$  مركز تماثل لـ  $C_f$

$$\forall x \in D_f \quad 1-x \in D_f$$

$$f(1-x) = 1 + \frac{1-2(1-x)}{(1-x)^2 - (1-x) - 2} = 1 - \frac{1-2x}{x^2-x-2}$$

$$2 - f(x) = 2 - 1 - \frac{1-2x}{x^2-x-2} = 1 - \frac{1-2x}{x^2-x-2}$$

إذن  $f(1-x) = 2 - f(x)$  ومنه  $I\left(\frac{1}{2}; 1\right)$  مركز تماثل لـ  $C_f$

د- نحدد معادلة المماس لـ  $C_f$  عند النقطة  $I$

$$y = f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + 1 \text{ هي معادلة المماس لـ } C_f \text{ عند النقطة } I$$

$$\text{أي } y = \frac{8}{9}x + \frac{5}{9} \text{ ومنه } y = \frac{8}{9}\left(x - \frac{1}{2}\right) + 1$$


5- أ- ندرس الفروع اللانهائية

لدينا  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$  ومنه المستقيم ذا المعادلة  $y = 1$  مقارب أفقي للمنحنى  $C_f$

لدينا ومنه  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$  ومنه المستقيم ذا المعادلة  $x = 2$  مقارب عمودي للمنحنى  $C_f$

لدينا ومنه  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$  ومنه المستقيم ذا المعادلة  $x = -1$  مقارب عمودي للمنحنى  $C_f$

ب- ننشئ المنحنى  $C_f$



$$f(x) = \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$$

نعتبر الدالة العدية  $f$  للمتغير الحقيقي المعرفة بـ

1- حدد  $D_f$  و  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

2- أ- بين أن  $f$  دالة دورية و حدد دورها  
ب تأكد أن  $f$  زوجية استنتج  $D_E$  مجموعة دراسة  $f$

3- أدرس تغيرات  $f$  على  $D_E$

4- أنشئ المنحنى  $C_f$

الجواب

$$f(x) = \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$$

5- نحدد  $D_f$  و  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

ليكن  $x \in \mathbb{R}$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \cos x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 2k\pi \quad / k \in \mathbb{Z}$$

$$D_f = \mathbb{R} - \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\} \text{ اذن}$$

6- أ- نبين أن  $f$  دالة دورية و حدد دورها

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\} \quad 2\pi + x \in \mathbb{R} - \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\} \quad x - 2\pi \in \mathbb{R} - \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$$

اذن  $f$  دالة دورية و حدد دورها  $2\pi$

$$f(x + 2\pi) = \frac{1 + \cos(x + 2\pi)}{1 - \cos(x + 2\pi)} = \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} = f(x)$$

ب- نتأكد أن  $f$  زوجية نستنتج  $D_E$  مجموعة دراسة  $f$

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\} \quad -x \in \mathbb{R} - \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$D_E = ]0; \pi] \text{ ومنه}$$


$$\text{اذن } f \text{ زوجية} \quad f(-x) = \frac{1 + \cos(-x)}{1 - \cos(-x)} = \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} = f(x)$$

7- ندرس تغيرات  $f$  على  $D_E$

$$\forall x \in ]0; \pi] \quad f'(x) = \frac{(-\sin x)(1 - \cos x) - (1 + \cos x)\sin x}{(1 - \cos x)^2} = \frac{-2\sin x}{(1 - \cos x)^2}$$

$x$	0	$\pi$
$f'(x)$		0
$f(x)$	$+\infty$	0

8- أنشئ المنحنى  $C_f$



نعتبر  $f$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي المعرفة بـ:  $f(x) = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$

ليكن  $(C_f)$  منحنى الدالة  $f$  في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1- أ) حدد  $D_f$

ب) بين أن  $f$  دالة فردية

د) بين أن  $f$  دورية دورها  $2\pi$

ج) بين  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$  ثم حدد  $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x)$  مع تأويل النتيجة هندسيا

2- أ) بين أن  $\forall x \in ]0; \pi[ \quad f'(x) = \frac{1}{1 + \cos x}$

ب) أدرس تغيرات  $f$  على  $]0; \pi[$  و أعط جدول تغيراتها

3- أ) حدد تقعر  $(C_f)$

ب) أنشئ  $(C_f)$

الجواب

$$f(x) = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

2- أ) نحدد  $D_f$

$$D_f = \mathbb{R} - \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$$

ب) نبين أن  $f$  دالة فردية

لدينا  $\forall x \in \mathbb{R} - \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\} : -x \in \mathbb{R} - \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

$$f(-x) = \frac{1 - \cos(-x)}{\sin(-x)} = \frac{1 - \cos x}{-\sin x} = -\frac{1 - \cos x}{\sin x} = -f(x)$$

إذن  $f$  دالة فردية

د) نبين أن  $f$  دورية دورها  $2\pi$

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\} \quad x + 2\pi \in \mathbb{R} - \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$f(x + 2\pi) = \frac{1 - \cos(x + 2\pi)}{\sin(x + 2\pi)} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = f(x)$$

$f$  دورية دورها  $2\pi$

**ملاحظة:** بما أن  $f$  دورية دورها  $2\pi$  و  $f$  دالة فردية فان مجموعة الدراسة هي  $D_E = ]0; \pi[$

ج) نبين  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$  ثم نحدد  $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x)$  مع تأويل النتيجة هندسيا

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \frac{\frac{1 - \cos x}{x^2}}{\frac{\sin x}{x}} = 0 \times \frac{2}{1} = 0$$

$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{1 - \cos x}{\sin x} = +\infty$  ومنه المستقيم ذا المعادلة  $x = \pi$  مقارب للمنحنى  $(C_f)$

2- أ) نبين أن  $\forall x \in ]0; \pi[ \quad f'(x) = \frac{1}{1 + \cos x}$

$$\forall x \in ]0; \pi[ \quad f'(x) = \frac{\sin^2 x - (1 - \cos x) \cos x}{\sin^2 x} = \frac{1 - \cos x}{1 - \cos^2 x} = \frac{1}{1 + \cos x}$$

ب) ندرس تغيرات  $f$  على  $]0; \pi[$  و نعطي جدول تغيراتها

$$\forall x \in ]0; \pi[ \quad 1 + \cos x > 0 \quad \text{لأن } \forall x \in ]0; \pi[ \quad f'(x) > 0$$

ومنه  $f$  تزايدية على  $]0; \pi[$

$x$	0	$\pi$
$f$	0	$+\infty$

3-أ) نحدد تقعر  $(C_f)$

$$\forall x \in ]0; \pi[ \quad f'(x) = \frac{1}{1 + \cos x} \quad \text{لدينا}$$

$$\forall x \in ]0; \pi[ \quad f''(x) = \frac{\sin x}{(1 + \cos x)^2}$$


$x$	0	$\pi$
$f''(x)$		+

إذن  $(C_f)$  محدب على  $]0; \pi[$  وحيث  $f$  فردية فان  $(C_f)$  مقعر على  $]-\pi; 0[$

وبما أن  $f$  دورية دورها  $2\pi$  فان  $(C_f)$  محدب على كل مجال من شكل  $]2k\pi; \pi + 2k\pi[$  و مقعر على

$$]-\pi + 2k\pi; 2k\pi[ \quad \text{حيث } k \in \mathbb{Z}$$

ب) ننشئ  $(C_f)$



نعتبر الدالة العدية  $f$  للمتغير الحقيقي المعرفة بـ

$$\begin{cases} f(x) = x - \sqrt{1-x^2} & |x| \leq 1 \\ f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{x}{x^2+1} & |x| > 1 \end{cases}$$

- 1- أ) أدرس اتصال في النقطتين 1 و -1
- ب) أدرس اشتقاق  $f$  في النقطتين 1 و -1 و أول النتائج هندسيا
- 2- أ) أحسب  $f'(x)$  لكل  $x$  من  $]-1;1[$  ثم أحسب  $f'(x)$  لكل  $x$  من  $]-\infty; -1[ \cup ]1; +\infty[$
- ب) أدرس تغيرات  $f$
- 3- أدرس الفروع اللانهائية لـ  $C_f$  ثم الوضع النسبي لـ  $C_f$  و مقاربه.
- 5- أدرس تقعر  $C_f$
- 6- أنشئ  $C_f$

الجواب

$$\begin{cases} f(x) = x - \sqrt{1-x^2} & |x| \leq 1 \\ f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{x}{x^2+1} & |x| > 1 \end{cases}$$

- 4- أ) ندرس اتصال في النقطتين 1 و -1

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{2}x + \frac{x}{x^2+1} = 1 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x - \sqrt{1-x^2} = 1$$

ومنه  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$  اذن  $f$  متصلة في 1

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{2}x + \frac{x}{x^2+1} = -1 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} x - \sqrt{1-x^2} = -1$$

ومنه  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = f(-1)$  اذن  $f$  متصلة في -1

ب) ندرس اشتقاق  $f$  في النقطتين 1 و -1 و نؤول النتائج هندسيا

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x - \sqrt{1-x^2} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1 + \frac{\sqrt{1-x}}{1-x} \sqrt{x+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1 + \sqrt{\frac{1}{1-x}} \sqrt{x+1} = +\infty$$

ومنه  $f$  لا تقبل الاشتقاق على يسار 1 و منحني  $f$  يقبل نصف مماس عمودي على يسار 1

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{2}x + \frac{x}{x^2+1} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{2} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{2} + \frac{-x+1}{2(x^2+1)} = \frac{1}{2}$$

ومنه  $f$  تقبل الاشتقاق على يمين 1 و منحني  $f$  يقبل نصف مماس معامله الموجه  $\frac{1}{2}$  على يمين 1

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x - \sqrt{1-x^2} + 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} 1 - \frac{\sqrt{x+1}}{x+1} \sqrt{1-x} = \lim_{x \rightarrow -1^+} 1 - \sqrt{\frac{1}{1+x}} \sqrt{1-x} = -\infty$$

ومنه  $f$  لا تقبل الاشتقاق على يمين -1 و منحني  $f$  يقبل نصف مماس عمودي على يمين -1

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{\frac{1}{2}x + \frac{x}{x^2+1} + 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{2} + \frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{2} + \frac{x+1}{2(x^2+1)} = \frac{1}{2}$$

ومنه  $f$  تقبل الاشتقاق على يسار -1 و منحني  $f$  يقبل نصف مماس معامله الموجه  $\frac{1}{2}$  على يسار -1

5- أ) نحسب  $f'(x)$  لكل  $x$  من  $]-1;1[$  ثم أحسب  $f'(x)$  لكل  $x$  من  $]-\infty;-1[ \cup ]1;+\infty[$

$$\forall x \in ]-1;1[ \quad f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\forall x \in ]-\infty;-1[ \cup ]1;+\infty[ \quad f'(x) = \frac{1}{2} + \frac{x^2+1-2x^2}{x^2+1} = \frac{2}{2(x^2+1)} = \frac{1}{x^2+1}$$

ب) ندرس تغيرات  $f$

$$\forall x \in ]-1;1[ \quad f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{(\sqrt{1-x^2}-x)\sqrt{1-x^2}} \quad \text{لدينا}$$

$$\forall x \in [0;1[ \quad f'(x) > 0$$

$$\forall x \in ]-1;1[ \quad f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{(\sqrt{1-x^2}-x)\sqrt{1-x^2}}$$

إشارة  $f'(x)$  على  $]-1;0[$  هي إشارة  $1-2x^2$  على  $]-1;0[$

$$x \in ]-1;0[ \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\forall x \in \left] -1; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right[ \quad f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in \left] -\frac{\sqrt{2}}{2}; 0 \right[ \quad f'(x) > 0 \quad \text{ومنه}$$

$$\forall x \in ]-\infty;-1[ \cup ]1;+\infty[ \quad f'(x) > 0 \quad \text{ومنه} \quad \forall x \in ]-\infty;-1[ \cup ]1;+\infty[ \quad f'(x) = \frac{1}{x^2+1}$$

$x$	$-\infty$	$-1$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$1$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$\parallel$	$0$	$\parallel$	$+$
$f$	$-\infty$	$\nearrow -1$	$\searrow -\sqrt{2}$	$\nearrow 1$	$+\infty$

6- ندرس الفروع اللانهائية لـ  $C_f$  ثم الوضع النسبي لـ  $C_f$  و مقاربه.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2}x + \frac{x}{x^2+1} = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}x + \frac{x}{x^2+1} = +\infty \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - \frac{1}{2}x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{ومنه المستقيم } (D) \text{ ذا المعادلة } y = \frac{1}{2}x \text{ مقارب للمنحنى}$$

$C_f$

$$\forall x \in ]-\infty;-1[ \cup ]1;+\infty[ \quad f(x) - \frac{1}{2}x = \frac{x}{x^2+1}$$

ومنه  $C_f$  فوق  $(D)$  على  $]-1;+\infty[$  و  $C_f$  تحت  $(D)$  على  $]-\infty;-1[$

5- ندرس تقعر  $C_f$

$$\forall x \in ]-1;1[ \quad f''(x) = \frac{\sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} > 0$$


$$\forall x \in ]-\infty;-1[ \cup ]1;+\infty[ \quad f''(x) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2} \quad \text{ومنه} :$$



$$]1; +\infty[ \text{ مفعر على } C_f \text{ أي } \forall x \in ]1; +\infty[ \quad f''(x) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2} < 0$$

$$]-\infty; -1[ \text{ محدب على } C_f \text{ أي } \forall x \in ]-\infty; -1[ \quad f''(x) > 0$$

6- ننشئ  $C_f$



## تمرين 2

نعتبر الدالة العدية  $f$  للمتغير الحقيقي المعرفة بـ  $f(x) = \frac{1}{\cos x} + \frac{1}{\sin x}$

1- حدد  $D_f$  حيز تعريف الدالة  $f$

2- أ- بين أن دور للدالة  $f$

ب- بين أن  $f(x+\pi) = -f(x) \quad \forall x \in D_f$

3- أحسب  $f'(x)$

4- أدرس تغيرات  $f$  على  $[0; \pi] \cap D_f$

5- أنشئ منحنى قصور الدالة  $f$  على  $[0; 2\pi] \cap D_f$

الجواب

$$f(x) = \frac{1}{\cos x} + \frac{1}{\sin x}$$

3- نحدد  $D_f$

ليكن  $x \in \mathbb{R}$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \sin x \neq 0 \quad \text{et} \quad \cos x \neq 0$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \left( x \neq k\pi \quad \text{et} \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \right) \quad / k \in \mathbb{Z}$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow x \neq k\frac{\pi}{2} \quad / k \in \mathbb{Z}$$

$$D_f = \mathbb{R} - \left\{ k\frac{\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\} \quad \text{اذن}$$

4- أ- بين أن دور للدالة  $f$

$$\forall x \in \mathbb{R} - \left\{ k\frac{\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\} \quad x \in \mathbb{R} - \left\{ k\frac{\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$f(x+2\pi) = \frac{1}{\sin(x+2\pi)} + \frac{1}{\cos(x+2\pi)} = f(x)$$

اذن دور للدالة  $f$

ب- نبين أن  $f(x+\pi) = -f(x)$   $\forall x \in D_f$

$$\forall x \in D_f \quad f(x+\pi) = \frac{1}{\sin(x+\pi)} + \frac{1}{\cos(x+\pi)} = \frac{1}{-\sin x} + \frac{1}{-\cos x} = -f(x)$$

3- نحسب  $f'(x)$

$$f'(x) = \frac{-\cos x}{\sin^2 x} + \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} = \frac{(\sin x - \cos x)(1 + \cos x \cdot \sin x)}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} = \frac{(\sin x - \cos x) \left(1 + \frac{\sin 2x}{2}\right)}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}$$

4- ندرس تغيرات  $f$  على  $[0; \pi] \cap D_f$

إشارة  $f'(x)$  هي إشارة  $\sin x - \cos x$

$$x \in \left] 0; \frac{\pi}{2} \right[ \cup \left] \frac{\pi}{2}; \pi \right[ \quad \sin x - \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4}$$

$x$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$
$f'(x)$	-	0	+	+
$f$	$+\infty$	$2\sqrt{2}$	$+\infty$	$+\infty$

5- ننشئ منحنى قصور الدالة  $f$  على  $[0; 2\pi] \cap D_f$

$$C_f \quad \lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = +\infty \quad \text{ومنه المستقيم ذا المعادلة } x = \pi \text{ مقارب للمنحنى}$$

$$C_f \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = -\infty \quad \text{ومنه المستقيم ذا المعادلة } x = \frac{\pi}{2} \text{ مقارب للمنحنى}$$

$$C_f \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{ومنه المستقيم ذا المعادلة } x = 0 \text{ مقارب للمنحنى}$$

$$f(x+\pi) = -f(x) \quad \text{حيث} \quad \left] \pi; \frac{3\pi}{2} \right[ \cup \left] \frac{3\pi}{2}; 2\pi \right[ \quad \text{و نستنتج الجزء الأخر على} \quad \left] 0; \frac{\pi}{2} \right[ \cup \left] \frac{\pi}{2}; \pi \right[ \quad \text{ننشئ } C_f \text{ على}$$

