

ملخص درس الحسابيات في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية

I. مجموعات الأعداد

■ الأعداد الصحيحة الطبيعية تكون مجموعة نرمز لها بالرمز  $\mathbb{N}$  و نكتب:  $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \dots\}$

■ الأعداد الصحيحة النسبية أي الأعداد الصحيحة الطبيعية و مقابلاتها تكون مجموعة نرمز لها بالرمز  $\mathbb{Z}$

و نكتب:  $\mathbb{Z} = \{\dots -3; -2; 0; 1; 2; 3; \dots\}$

■ الأعداد العشرية تكون مجموعة نرمز لها بالرمز  $D$

■ الأعداد الجذرية أي الأعداد التي تكتب على الشكل  $\frac{a}{b}$  حيث:

$a \in \mathbb{Z}$  و  $b \in \mathbb{N}^*$  تكون مجموعة نرمز لها بالرمز  $\mathbb{Q}$ .

■ الأعداد الجذرية و اللاجذرية تكون مجموعة الأعداد الحقيقية و نرمز لها بالرمز  $\mathbb{R}$ .

استعمال الرموز:  $\in$ ;  $\notin$ ;  $\subset$ ;  $\supset$

(1) العدد -7 هو عنصر من  $\mathbb{Z}$  نكتب  $-7 \in \mathbb{Z}$  نقراً: "-7 ينتمي الى  $\mathbb{Z}$ "

" في حين -7 لا ينتمي الى  $\mathbb{N}$  و نكتب  $-7 \notin \mathbb{N}$  ولدنيا  $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$

(2)  $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$  لكن  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$  لأنه لا يمكن ايجاد عددين صحيحين  $a$  و

$b$  بحيث  $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$  و  $b$  غير منعدم.

(3) كل عدد صحيح طبيعي هو عدد صحيح نسبي، نقول ان المجموعة  $\mathbb{N}$  توجد ضمن  $\mathbb{Z}$  و نكتب  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ .

(4) ليس كل عدد عشري هو عدد صحيح نسبي، نقول ان المجموعة  $D$  ليست ضمن  $\mathbb{Z}$  و نكتب  $D \not\subset \mathbb{Z}$ .

لأن هناك عناصر من  $D$  لا تنتمي الى  $\mathbb{Z}$ . كذلك: كل عنصر من  $D$  هو عنصر من  $\mathbb{Q}$ :  $D \subset \mathbb{Q}$ .

(5) كل عنصر من  $\mathbb{Q}$  هو عنصر من  $\mathbb{R}$ :  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ . لدينا اذن:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset D \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

II. العمليات في المجموعة  $\mathbb{R}$  وخاصياتها

1. العمليات في المجموعة  $\mathbb{R}$

الجمع في  $\mathbb{R}$ :  $a$  و  $b$  و  $c$  أعداد حقيقية

$$a + b = b + a \quad (1)$$

$$a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c \quad (2)$$

$$a + 0 = 0 + a = a \quad (3)$$

$$(-a) + a = a + (-a) = 0 \quad (4)$$

الضرب في  $\mathbb{R}$ :  $a$  و  $b$  و  $c$  أعداد حقيقية

$$a \times b = b \times a = ab = ba \quad .1$$

$$a(bc) = (ab)c = (ac)b = abc \quad .2$$

$$a \neq 0; a \times \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \times a = \frac{a}{a} = 1 \quad .3$$

العمليات على الكسور وخاصيات:

و  $b$  و  $c$  و  $d$  أعداد حقيقية بحيث  $bd \neq 0$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad (2) \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b} \quad (1)$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad (4) \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd} \quad (3)$$

$$\frac{a}{b} = a \times \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}; bc \neq 0 \quad (6) \quad \frac{a}{c} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad (5)$$

$$a - b = a + (-b) \quad (8) \quad -a \text{ يسمى مقلوب } a \quad (7)$$

$$-(a - b) = -a + b \quad (9)$$

$$\frac{1}{a} \text{ يسمى مقلوب العدد } a \text{ حيث } a \neq 0 \quad (10)$$

$$\frac{a}{b} \text{ العدد } \frac{a}{b} \text{ حيث } a \in \mathbb{R} \text{ و } b \in \mathbb{R}^* \text{ يسمى خارج العدد } a \text{ على } b. \quad (11)$$

$$a = bc \text{ يكافئ } \frac{a}{b} = c \quad (12) \quad \frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$$

$$ad = bc \text{ يكافئ } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad (13)$$

$$a = 0 \text{ يكافئ } \frac{a}{b} = 0 \quad (15) \quad a = b \text{ يكافئ } \frac{a}{b} = 1 \quad (14)$$

III. متطابقات هامة النشر و التعميل:

(1) خاصيات: لكل  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{R}$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (2) \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (1)$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad (3)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad (4)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad (5)$$

$a$  و  $b$  و  $k$  أعداد حقيقية

$$k(a - b) = ka - kb \quad k(a + b) = ka + kb \quad \blacksquare$$

$$(a + b)(c - d) = ac - ad + bc - bd \quad \blacksquare$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \quad \blacksquare$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad \blacksquare$$

(2) النشر

أمثلة: أنشر:  $x \in \mathbb{R}$  :  $(\sqrt{2} - 3)^2$ ,  $(2x + 1)^2$ ,  $-2x(3x - 4)$ ,

$(2x + 1)^3$ ,  $(x - 1)^3$ ,  $(3\sqrt{3} - 2)(3\sqrt{3} + 2)$ ,  $(3x - 2)(x + 3)$

الأجوبة:  $(2x + 1)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = 4x^2 + 4x + 1$

$$(\sqrt{2} - 3)^2 = (\sqrt{2})^2 - 2 \times \sqrt{2} \times 3 + 3^2 = 2 - 6\sqrt{2} + 9 = 11 - 6\sqrt{2}$$

$$-2x(3x - 4) = -6x^2 + 8x$$

$$(3x - 2)(x + 3) = 3x^2 + 9x - 2x - 6 = 3x^2 + 7x - 6$$

$$(3\sqrt{3} - 2)(3\sqrt{3} + 2) = (3\sqrt{3})^2 - 2^2 = 27 - 4 = 23$$

$$(x - 1)^3 = (x)^3 - 3(x)^2 \times 1 + 3 \times x \times (1)^2 - (1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

$$(2x + 1)^3 = (2x)^3 + 3(2x)^2 \times 1 + 3 \times 2x \times (1)^2 + (1)^3 = 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$$

### 3) التعميل

أمثلة : عمل التعبيرات التالية:

$$C = 4x^2 - 9 \quad \text{و} \quad B = 9x - 3 \quad \text{و} \quad A = 3x^2 - 3x$$
$$F = 4x^2 + 4x + 1 \quad \text{و} \quad E = 16x^2 - 8x + 1 \quad D = x^3 - x^2$$

أجوبة:

**التعميل هو كتابة  
مجموع على شكل  
جداء**



$$A = 3x^2 - 3x = 3x(x - 1)$$

$$B = 9x - 3 = 3(3x - 1)$$

$$C = 4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2 = (2x - 3)(2x + 3)$$

$$D = x^3 - x^2 = x^2(x - 1)$$

$$E = 16x^2 - 8x + 1 = (4x)^2 - 2 \times 4x \times 1 + 1^2 = (4x - 1)^2$$

$$F = 4x^2 + 4x + 1 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = (2x + 1)^2$$

### IV. القوى و قوى العدد 10 و الكتابة العلمية:

1) تعريف: ليكن  $a$  عددا حقيقيا غير منعدم و  $n \in \mathbb{N}$ .

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_{\text{مرّة } n}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{و} \quad a^1 = a; a^0 = 1$$

لكل  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{R}^*$  و لكل  $m$  و  $n$  من  $\mathbb{N}$  لدينا:

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \quad \text{و} \quad a^n \times b^n = (ab)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad \text{و} \quad (a^n)^m = a^{nm} = (a^m)^n$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} = \frac{1}{a^{m-n}}$$

### حالة خاصة: قوى العدد 10:

$$10^{-2} = 0,01 \quad \text{و} \quad 10^0 = 1 \quad \text{و} \quad 10^1 = 10$$

$$10^n = \underbrace{1000 \dots 0}_n; n \in \mathbb{N} \quad \text{و} \quad 10^{-1} = 0,1$$

**مثال:** أحسب وبسط :  $A = \frac{(10^6)^4 \times 10^{-2}}{10^4 \times 10^6 \times 10^{-13}}$

$$B = \frac{10^{-8} \times 10^9 \times 10^7 \times 10^{-4}}{10^{-2} \times 10^3 \times 10^5}$$

**الجواب:**

$$A = \frac{(10^6)^4 \times 10^{-2}}{10^4 \times 10^6 \times 10^3} = 10^{24} \times 10^{-2} \times 10^{-4} \times 10^{-6} \times 10^3 = 10^1 = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$B = \frac{10^{-8} \times 10^9 \times 10^7 \times 10^{-4}}{10^2 \times 10^3 \times 10^5} = 10^{-8} \times 10^9 \times 10^7 \times 10^{-4} \times 10^{-2} \times 10^{-3} \times 10^{-5}$$

$$B = 10^{-8+9+7-4+2-3-5} = 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0,01$$

### 2) الكتابة العلمية:

كل عدد عشري  $x$  موجب يكتب على الشكل  $x = a \times 10^p$  حيث  $p$  ينتمي الى  $\mathbb{Z}$  و  $a$  عدد عشري بحيث  $1 \leq a < 10$ . هذه الكتابة تسمى الكتابة العلمية.

**ملحوظة:** إذا كان  $x$  عددا سالبا فان كتابته العلمية هي

$$x = -a \times 10^p$$

**أمثلة:** (1) المسافة بين الأرض و الشمس هي: 149597870 كلم, تكتب  $1,4959787 \times 10^8$  كلم.

(2) الكتابة العلمية للعدد: 149597870 كلم هي  $1,4959787 \times 10^8$  كلم.

(3)  $3,25 \times 10^4$  هي كتابة علمية

(4) الكتابة العلمية للعدد :  $-17000000$  هي  $-1,7 \times 10^7$

### V. الجذور المربعة:

**تعريف:** ليكن  $x$  عددا حقيقيا موجبا. نسمي جذر مربع  $x$ , العدد الحقيقي الموجب  $y$ .

بحيث  $x = y^2$ . و نكتب  $y = \sqrt{x}$ .

$\sqrt{x} = y$  يكافئ  $x = y^2$  و  $x \geq 0$ .

**أمثلة:**  $\sqrt{9} = 3$  و  $\sqrt{81} = 9$

**خاصية:** لكل  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{R}^+$  لدينا:

$$(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a^2} = a \quad \text{و} \quad (\sqrt{a})^n = \sqrt{a^n}; n \in \mathbb{N}^* (1)$$

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad \text{و} \quad \sqrt{\frac{1}{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}}; a > 0 \quad \text{و} \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}; b > 0$$

(2) إذا كان  $x \geq 0$  و  $y \geq 0$  فان :  $\sqrt{x} = \sqrt{y}$  يكافئ  $x = y$ .

(3)  $\sqrt{x} = 0$  إذا و فقط إذا كان  $x = 0$ .

### VI. التناسبية

**تعريف:**  $a$  و  $b$  و  $c$  و  $d$  أعداد حقيقية بحيث  $bd \neq 0$

نقول إن الأعداد  $a$  و  $b$  و  $c$  و  $d$  تكون في هذا الترتيب تناسبا إذا

$$\text{و فقط إذا كان : } \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

**مثال:** حدد العدد الحقيقي  $x$  إذا علمت أن الأعداد :  $x + 1$  و  $3$  و

$x$  و  $2$  تكون في هذا الترتيب تناسبا

**الجواب:**  $x + 1$  و  $3$  و  $x$  و  $2$  تكون في هذا الترتيب تناسبا

$$\text{يعني } \frac{x+1}{3} = \frac{x}{2} \text{ يعني } 2(x+1) = 3x$$

$$\text{يعني } 2x + 2 = 3x \text{ يعني } -x = -2 \text{ يعني } x = 2$$